

Ранголи-Ципрос, КД

СИСТЕМНЫЙ И КОНТАКТНЫЙ ФУНГИЦИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ОТ ШИРОКОГО СПЕКТРА ИНФЕКЦИЙ



Действующее вещество:

Пропиконазол + Ципроконазол



Препаративная форма:

концентрат эмульсии



Концентрация:

250 г/л + 80 г/л



Норма расхода рабочей жидкости:

200-300 л/га



Тара:

канистра 5 л

Механизм действия

Действующие вещества препарата Ранголи-Ципрос относятся к химическому классу триазолов. Подавляют синтез эргостерина, который жизненно необходим для жизнедеятельности гриба. При совместном действии этих двух веществ отмечен синергетический эффект и, следовательно, увеличение скорости воздействия препарата. Препарат можно использовать как в начальные фазы развития культур, так и при проявлении симптомов заболеваний, при этом препарат эффективен против ржавчинных грибов, пятнистостей, мучнистой росы вне зависимости от стадии развития болезни. Обладает длительным защитным действием (более 4-х недель). Совместим при применении в баковых смесях с большинством инсектицидов, жидких удобрений, регуляторов роста.

Преимущества препарата:

- Обладает профилактическим, лечебным и продолжительным защитным действием;
- Высокоэффективен против комплекса заболеваний зерновых культур вне зависимости от стадии развития инфекции;
- Благодаря системному действию быстро проникает в растение, обеспечивая незамедлительную защиту, и, спустя час после применения, практически не смывается дождем;
- Препарат не фитотоксичен, один из изомеров пропиконазола имеет росторегулирующее действие на зерновых культурах;

- Благодаря сочетанию двух действующих веществ одного химического класса, проявляется синергетический эффект и, как следствие, более эффективное действие и снижение норм расхода препарата.

Технологии применения пестицида:

Совместим с большинством пестицидов, обычно используемых на зерновых. Однако рекомендуется проверять смешиваемые препараты на совместимость. Период защитного действия 14-20 дней. Поступает в растения в течение нескольких часов после обработки через листья и стебли и перемещается акропетально. В рекомендованных нормах расхода препарат не фитотоксичен. Не токсичен. Известны случаи формирования устойчивых популяций патогенов, однако при применении препарата порекомендованным регламентам, риск возникновения резистентности у патогенов находится на среднем уровне.

Культура	Вредный объект	Норма применения препарата, л/га	Способ, время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)
Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса	0,4-0,5	Опрыскивание в период вегетации	40 (1)
Ячмень яровой, озимый	Гельминтоспориозные пятнистости (темно-бурая, сетчатая, полосатая), карликовая ржавчина, стеблевая ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз			
Рожь озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз, септориоз			
Овес	Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость			