

Ранголи-Таргон-С, КЭ

СИСТЕМНЫЙ ПОСЛЕВСХОДОВЫЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ БОРЬБЫ С ОДНОЛЕТНИМИ И МНОГОЛЕТНИМИ ЗЛАКОВЫМИ СОРНЯКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПЫРЕЕМ ПОЛЗУЧИМ В ПОСЕВАХ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ



Действующее вещество:
Хизалофоп-П-этила



Препаративная форма:
концентрат эмульсии



Концентрация:
50 г/л



Норма расхода рабочей жидкости:
200-300 л/га



Тара:
канистра 5 л



Класс опасности:
3 класс



Хранение:
от +5°C до +35°C

Механизм действия

Действующее вещество быстро поглощается листьями и разносится по всему растению, достигая зон непосредственного действия в точках роста стеблей и корней. Нарушает синтез жирных кислот, что приводит к гибели сорняков.

Преимущества препарата:

- Идеально решает проблему уничтожения злаковых сорняков, начиная с фазы 1-2 настоящих листьев сорняков;
- Ранголи-Таргон-С уничтожает подземную часть злаковых сорняков и предотвращает возможность повторного отрастания;
- Высокое качество и низкая стоимость;
- Имеет высокую эффективность в борьбе с падалицей зерновых культур при минимальных дозах;
- Отсутствует последствие препарата на следующие культурные растения в севообороте;
- Применяется в широком диапазоне фаз роста культурных растений;
- Совместим с большинством пестицидов (не рекомендуется смешивать с фосфорорганическими инсектицидами в связи со снижением биологической эффективности).

Технологии применения пестицида:

Совместим с большинством фунгицидов, инсектицидов и гербицидов, применяемых против двудольных сорняков. Наивысшая активность препарата Ранголи-Таргон-С проявляется при теплой погоде, достаточно увлажненной почве в период активного роста сорняков. В засушливую погоду рекомендуется использовать норму, выше средней. Полная гибель однолетних сорняков проявляется через 7-10 дней после опрыскивания, многолетних – через 15-20 дней. Механическое возделывание почвы можно проводить не ранее, чем через 3 суток после использования препарата. При длительном снижении температуры эффект от опрыскивания наступает позже.

Препарат Ранголи-Таргон-С, примененный в малых дозах (0,8-1,0 л/га), высокоэффективен в борьбе с падалицей предыдущих сельскохозяйственных зерновых культур. Препарат быстро разлагается в почве (период полураспада – 7 дней), благодаря чему не представляет опасности для последующих культур севооборота.

Культура	Вредный объект	Норма применения препарата, л/га	Способ, время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)
Свекла сахарная	Однолетние и злаковые сорняки	2,0-3,0	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков	60 (1)
	Многолетние и злаковые сорняки (пырей ползучий)		Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см	