

Ранголи-Базорон, ВР

ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНЫЙ ГЕРБИЦИД КОНТАКТНОГО ДЕЙСТВИЯ
ДЛЯ БОРЬБЫ С ОДНОЛЕТНИМИ ДВУДОЛЬНЫМИ СОРНЯКАМИ
В ПОСЕВАХ ГОРОХА И СОИ



Действующее
вещество:
бентазон



Препаративная
форма:
водный раствор



Концентрация:
480 г/л



Норма расхода
рабочей жидкости:
200-300 л/га



Тара:
канистра 20 л



Класс опасности:
3 класс



Хранение:
от -5°C до +40°C

Механизм действия

Ранголи-Базорон имеет ярко выраженное контактное действие. Действующее вещество препарата ограничено проникает в мезофилл листьев и нарушает процесс фотосинтеза. Первые видимые признаки действия препарата заметны через 3-5 дней, наблюдается хлорoticность листьев, потеря тургора и др. Гибель сорняков наступает через 15-20 дней после обработки.

Преимущества препарата:

- Ранголи-Базорон обладает широким спектром действия, уничтожает наиболее распространенные виды однолетних двудольных сорняков, в том числе устойчивых к 2,4-Д и МЦПА;
- Идеально подходит для защиты зернобобовых культур, сои;
- Прекрасно сочетается с другими гербицидами, что существенно расширяет спектр действия его на сорную растительность;
- Ранголи-Базорон обладает высокой скоростью действия, первые симптомы можно наблюдать уже через 3-5 суток.

Технологии применения пестицида:

Препарат применяется путем наземного опрыскивания. Ранголи-Базорон совместим в баковых смесях с препаратами, имеющими нейтральную и щелочную реакцию. Не совместим с препаратами, имеющими кислую реакцию среды.

Избирателен для зернобобовых культур. Уничтожает многие виды двудольных и некоторые виды осоковых сорняков. Видимые признаки угнетения сорняков в зависимости от погодных условий проявляются через 3-7 дней после обработки гербицидом.

Полная гибель сорняков наступает примерно через 2 недели. Не отмечено фитотоксичности для зерновых культур при использовании гербицида Ранголи-Базорон. За длительный период использования бентазона случаев возникновения резистентности не выявлено.

Культура	Вредный объект	Норма применения препарата, л/га	Способ, время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)
Горох на зерно	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	2-3	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувствительность	60 (1)
Соя	Однолетние двудольные сорняки, в том числе дурнишник обыкновенный	1,5-3	Опрыскивание посевов начиная с фазы первого настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-6 листьев)	60 (1)