

Ранголи-Галситил, КД

ПОСЛЕВСХОДОВЫЙ СИСТЕМНЫЙ ГЕРБИЦИД ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ БОЛЬШИНСТВА ВИДОВ ОДНОЛЕТНИХ И МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ СОРНЯКОВ В ПОСЕВАХ ДВУДОЛЬНЫХ



Действующее вещество:
Галоксифоп-П-метил



Препаративная форма:
концентрат эмульсии



Концентрация:
104 г/л



Норма расхода рабочей жидкости:
200-300 л/га



Тара:
Канистра 5 л



Класс опасности:
3 класс



Хранение:
от -10°C до +30°C

Механизм действия

Ранголи-Галситил оказывает гербицидное действие на чувствительные сорняки, присутствующие во время обработки. Действие гербицида на многолетние злаковые сорняки сохраняется до конца вегетационного периода.

Обладает высокой системной активностью, после обработки быстро проникает в листья сорных растений, по сосудистой системе перемещается ко всем органам (включая корни и корневища), вызывая массовое поражение точек роста у чувствительных злаков. Для полного поглощения гербицида с поверхности листьев требуется только один час. Осадки, спустя час после обработки, не влияют на эффективность препарата.

Первые видимые симптомы действия препарата становятся заметны на 5-7 день после опрыскивания. Полное отмирание сорных злаков происходит позднее (через 10-15 дней и позднее, в зависимости от погодных условий).

Преимущества препарата:

- Уничтожает однолетние и многолетние злаковые сорняки;
- Применяется после всходов сельскохозяйственных культур, в период активного роста сорняков;

- Обладает системным действием, быстро поглощается листьями сорняков и переносится к их точкам роста, корням и корневищам;
- Селективен по отношению к широколистным культурам;
- Обеспечивает высочайшую эффективность при малых нормах расхода;
- Может применяться в баковых смесях с гербицидами, предназначенными для борьбы с широколистными сорняками и с инсектицидами.

Технологии применения пестицида:

Допускается совмещение в применении с другими гербицидами на основе следующих действующих веществ: клопиралида, фенмедифама, десмедифама, этофумезата и тому подобных, а также инсектицидами. Перед приготовлением рабочего раствора в смеси с другими препаратами рекомендуется проверить физическую совместимость препаратов в малой емкости.

Культура	Вредный объект	Норма применения препарата, л/га	Способ, время обработки	Срок ожидания (кратность обработок)
Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, рапс яровой	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное)	0,5	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев до кущения)	60 (1)
Свекла сахарная и кормовая, рапс яровой, подсолнечник	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	1,6	Опрыскивание посевов, при высоте сорняков 10-15 см	